



POIDS MOYEN DES OISEAUX (KG)	Dose quotidienne de Panacur® AquaSol™ (ml) selon la grosseur de l'élevage						
	500	1000	5000	10000	20000	50000	100000
0.5	1.25	2.5	12.5	25	50	125	250
0.6	1.5	3	15	30	60	150	300
0.7	1.75	3.5	17.5	35	70	175	350
0.8	2	4	20	40	80	200	400
0.9	2.25	4.5	22.5	45	90	225	450
1	2.5	5	25	50	100	250	500
1.1	2.75	5.5	27.5	55	110	275	550
1.2	3	6	30	60	120	300	600
1.3	3.25	6.5	32.5	65	130	325	650
1.4	3.5	7	35	70	140	350	700
1.5	3.75	7.5	37.5	75	150	375	750
1.6	4	8	40	80	160	400	800
1.7	4.25	8.5	42.5	85	170	425	850
1.8	4.5	9	45	90	180	450	900
1.9	4.75	9.5	47.5	95	190	475	950
2	5	10	50	100	200	500	1000
2.1	5.25	10.5	52.5	105	210	525	1050
2.2	5.5	11	55	110	220	550	1100
2.3	5.75	11.5	57.5	115	230	575	1150
2.4	6	12	60	120	240	600	1200
2.5	6.25	12.5	62.5	125	250	625	1250
2.6	6.5	13	65	130	260	650	1300
2.7	6.75	13.5	67.5	135	270	675	1350
2.8	7	14	70	140	280	700	1400

POIDS MOYEN DES OISEAUX (KG)	Dose quotidienne de Panacur® AquaSol™ (ml) selon la grosseur de l'élevage						
	500	1000	5000	10000	20000	50000	100000
2.9	7.25	14.5	72.5	145	290	725	1450
3	7.5	15	75	150	300	750	1500
3.1	7.75	15.5	77.5	155	310	775	1550
3.2	8	16	80	160	320	800	1600
3.3	8.25	16.5	82.5	165	330	825	1650
3.4	8.5	17	85	170	340	850	1700
3.5	8.75	17.5	87.5	175	350	875	1750
3.6	9	18	90	180	360	900	1800
3.7	9.25	18.5	92.5	185	370	925	1850
3.8	9.5	19	95	190	380	950	1900
3.9	9.75	19.5	97.5	195	390	975	1950
4	10	20	100	200	400	1000	2000
4.1	10.25	20.5	102.5	205	410	1025	2050
4.2	10.5	21	105	210	420	1050	2100
4.3	10.75	21.5	107.5	215	430	1075	2150
4.4	11	22	110	220	440	1100	2200
4.5	11.25	22.5	112.5	225	450	1125	2250
4.6	11.5	23	115	230	460	1150	2300
4.7	11.75	23.5	117.5	235	470	1175	2350
4.8	12	24	120	240	480	1200	2400
4.9	12.25	24.5	122.5	245	490	1225	2450
5	12.5	25	125	250	500	1250	2500
5.1	12.75	25.5	127.5	255	510	1275	2550
5.2	13	26	130	260	520	1300	2600

Les profits commencent par le traitement des infestations

Conseils pratiques pour le dosage :

- Calculer le volume de Panacur® AquaSol™ nécessaire selon le poids corporel total des poulets à traiter.
- L'eau médicamentée doit être préparée de façon quotidienne avant chaque traitement.
- Administrer l'eau médicamentée dans les 24 heures qui suivent sa préparation.

* Consulter la notice jointe à l'emballage pour plus de détails.